



宏恩藥訊

94年4月號

Country Hospital Drug Bulletin

發行人：孟憲傑 出版：台北宏恩綜合醫院藥劑科 網址：www.country.org.tw
總編輯：黃宗炎 地址：台北市仁愛路四段 61 號 電話：(02)2771-3161
主編：陳國龍 e 址：country_pharm@mail2000.com.tw
副主編：林慕香、游壽連、官永祥 編輯：黃以瑜、楊欣怡、邱子洹、王靖蕙

藥品介紹

Tamoxifen

陳國龍藥師

商品名稱：Tamoxifen，Tamoplex，Tamofen

藥物劑型：10mg/tab. (10 毫克/錠)

臨床應用：乳癌的輔助性治療

醫療人員需知：

- 1•本藥(tamoxifen)是一種非固醇類的抗雌性素(antiestrogen)製劑，但同時亦具微弱的促雌性分泌作用。
Tamoxife 可抑制雌二醇(estradiol)的 uptake，與 estrogen 互相競爭子宮及乳腺組織的接受體。雖然其真正的抗腫瘤機轉目前尚不確定，但一般相信此與其抗雌性素作用有關。
- 2•Tamoxifen 主藥適應症為治療停經後婦女的乳癌，但臨床上可用於抑制婦女的產後乳汁分泌、治療男性精蟲減少症以及誘導排卵等。本藥用於乳癌之治療劑量，初劑量每次 10mg，每日兩次給藥；如一個月後仍然效果不彰，則須增加劑量為每次 20mg，一日兩次。一般而言，本藥之治療效果應於 4—10 週出現。
- 3•懷孕婦女不可投與 tamoxifen；處於停經前之病患，必須嚴密注意其懷孕的可能性。此外，對於白血球或血小板減少之病患，本藥亦需慎重投

與。而骨質轉移性病人初期治療時，可能產生高血鈣症，如情況嚴重時，則需停止本藥之治療。

病患用藥指導：

- 1•本藥大多數用於治療停經後之婦女；停經期前的婦女，因本藥會抑制月經的到來，不宜使用。至於懷孕的婦女，切不可投予本藥治療。
- 2•與男性荷爾蒙相較，本藥之副作用較輕微；而副作用主要是由於其抗雌性素作用所引致，如潮熱感、陰道出血、陰部騷癢等。其他如胃腸道不適、頭部輕浮感及體液滯留等，亦是常見之症狀。
- 3•本藥服用期間，應儘可能定期檢查相關的血球計數(如白血球、血小板等)。另對於血中鈣離子、膽固醇、三酸甘油脂的濃度以及肝功能、眼科相關檢察等，亦須予以定期的檢測，避免嚴重副作用的產生。

藥品介紹**Glibenclamide (Glyburide)**

游壽連藥師

商品名稱：Euglucon，Diabitin，Daonil

藥物劑型：5 毫克／錠

臨床應用：非胰島素依賴型糖尿病（NIDDM）。

醫療人員需知：

- ★本藥之藥效長達 24 小時，每日服用一次即可；起始劑量為每天 2.5~5 毫克，但每週調整劑量不宜超過 2.5 毫克。若每日劑量大於 10 毫克時，應分次服用。每日最大劑量不得超過 20 毫克，以免藥效未增強，反而加重副作用。
- ★本藥吸收的速率及程度不受食物影響，故長期使用者，可固定於飯前 30 分鐘服用，亦可與食物併服。
- ★最常見及嚴重的副作用為低血糖，尤其是年老、體弱、營養不良者，或有肝、腎、腦下垂體、腎上腺、甲狀腺等功能不全者更易發生。上述病患使用本藥時，其起始劑量應減為每天 1.25~2.5 毫克，並需小心調整劑量，以免發生低血糖。老年人的低血糖症狀較難以辨識，往往只有中樞神經症狀如焦慮、神智不清、嗜睡、昏迷等，常需細心觀察之。
- ★本藥與其他藥物之交互作用，Thiazide 類之利尿劑會降低血鉀而減少胰島素之分泌，導致血糖上升； β -blocker 除了會減少胰島素之分泌，也會遮蔽及延長低血糖之症狀；chloramphenicol 及 probenecid 可能增加本藥降血糖之作用；corticosteroids，thyroid agents，estrogens，phenytoin，rifampin，及 isoniazid 等則可能降低本藥降血糖之作用，故本藥與上述藥物合用時，應小心監測血糖之變化。
- ★當急性或嚴重疾病時，如燒傷、感

染、外傷、糖尿病性昏迷或進行重大手術時，血糖起浮不定，宜選用胰島素來控制血糖。若使用本藥則血糖較不易控制，應視為禁忌。

- ★本藥不建議孕婦使用，因其不能提供良好的血糖控制，而母體血糖控制不佳，將導致胎兒先天性異常之比例增加；本藥可通過胎盤影響胎兒血糖，尤其是分娩前使用，可能造成新生兒嚴重而持久的低血糖，故建議使用胰島素來控制糖尿病孕婦的血糖。
- ★本藥是否會進一步乳汁中尚待證實，但有可能造成胎兒低血糖現象，故使用本藥期間應避免哺乳嬰兒。

病患用藥指導：

- ★本藥可於飯前 30 分鐘服用或與食物併服，因不受食物影響，但須每天固定時間服藥，且不可任意增減劑量。
- ★習慣於餐前 30 分鐘服藥者，用藥後務必記得進食，以免造成低血糖。空腹服用本藥後若仍有腸胃不適現象，則可改與食物併服。
- ★服用本藥控制血糖仍應遵守血糖仍應遵守飲食及體重之控制，並維持適當運動，以免降低本藥之藥效。
- ★低血糖反應之認識及處理：服用本藥期間若延遲用餐、未進食、過度運動、因噁心嘔吐而不能進食、大量飲酒等，或服用本藥過量時，皆易發生低血糖，其症狀為心跳加速、冒冷汗、震顫、頭痛、視力模

糊，重者會喪失意識、抽搐、昏迷等。一旦有上述低血糖之症狀時，立即吃兩顆方糖或喝含糖之果汁。若症狀未解除，應立即就醫。

★避免飲酒及服用非醫囑之藥物，以免影響血糖之控制(過高或過低)。

★如果有多渴、多尿、發燒、喉嚨痛、皮疹或不尋常的出血現象時應即就醫。

★應隨身攜帶糖尿病標示卡及方糖，並定時自我監測血糖，及定期至門診追蹤檢查。

藥品諮詢

口服抗生素用藥指導

劉雅慧藥師

◎適應症：

抗生素具有消滅或抑制其他微生物生長之作用，用於治療微生物例如：細菌、黴菌、原蟲與寄生蟲等所感染的疾病。如我們所熟知之盤尼西林類、頭孢子菌素類、四環素類、紅黴素、胺基配糖體等。

◎用藥方式：

- 1、請遵照醫師或藥師指示服用，平均分配服藥間隔，固定時間服藥，並以一大杯水同服，而果汁或汽水均不適合。
- 2、一般抗生素以空腹服用（飯前一小時或飯後二小時）之吸收效果較好，若對胃部造成刺激時，則可與食物一起服用。
- 3、如為長效釋放錠，請勿咬碎；如為口服懸浮液，使用前要搖勻，並使用量杯或包裝盒內所附之滴管，量取正確之藥量。
- 4、抗生素之懸液粉劑，請依藥袋指示泡製後再行服用，並需置於冰箱下層儲存，依藥品種類之不同，稀釋後之保存期限為 7~14 天。
- 5、請將藥品連同藥袋放置於密閉容器，置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷凍；除稀釋後之懸液外，亦請勿冷藏。
- 6、藥物請存放高處，勿讓幼童輕易取得。

◎用藥注意事項：

- 1、治療期間，不可因為自覺病情好轉而擅自停藥或減量服用，即使症狀消失，仍需繼續使用，完成整個治療程，否則可能會復發或造成抗藥性菌種之產生。
- 2、若您曾有過敏史(對青黴素、頭孢子菌類、磺胺類抗菌劑)、懷孕、授乳、或其他疾病(氣喘、蠶豆症、枯草熱或肝腎疾病等)或正服用其他藥物，請務必事先告知醫師。
- 3、四環素類及氟化萘啶類抗生素，因會與鈣、鎂、鋁、鐵等離子結合而失去藥效，故應避免與牛乳或乳類製品、制酸劑及含鈣、鐵質礦物質的綜合維他命一起服用。
- 4、四環素類易導致牙齒琺瑯質發育不全及永久性之變色，因而禁用於 8 歲以下之兒童、孕婦及授乳婦女。此外，此類藥品可能使皮膚會對日光過度敏感，因此必要時需做防曬措施例如穿長袖長褲撐傘或使用防曬製品。
- 5、請勿讓您的藥品給其他人服用。

◎此藥品可能引起的副作用及處理方式：

⚠如出現以下症狀：喉嚨發炎、呼吸困難、氣喘、蕁麻疹、發紅、發

癢、不正常出血、皮膚或眼睛顏色變黃現象。

處理方式：請停藥並立刻就醫。

⚠如出現以下症狀：噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛腹脹、食慾降低、味覺變差等現象。

處理方式：可與大量水或食物併服，以降低胃腸道之不適症狀。

⊙忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；若想起時已接近下次服藥時間，則不須補服，於下次的服藥時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

藥品異動通知

1 ·〔URKT〕UROKIT-K 540MG TAB.

因廠商庫存不足，停止供貨，待庫存用完為止，以 UROKIT-K 1080MG (10mEq) TAB. 取代。

2 ·〔HLDT〕HALDOL 0.5MG TAB.

因廠商停產而停用。
