

藥科字第 10103-002 號

### 重要訊息通知：

加拿大( Health Canada )政府評估一項於荷蘭進行的研究報告，於3月2日發布含domperidone (本院DOMTOO )成分藥品之安全資訊，提醒該成分藥品與心室心律不整及突發性心因性死亡之關連性。

最近藥物流行病學研究顯示，用於促進腸胃蠕動的domperidone，有可能與增加心室心律不整及突發性心因性死亡的風險有相關性。因此提出以下建議：

1. Domperidone 應以最小有效劑量為起始治療劑量，包括使用於帕金森氏症病人。
2. 較高的心室心律不整及突發性心因性死亡風險，可能出現於每天服用domperidone 劑量超過30mg 的病人，及年齡大於60 歲以上的病人。
3. Domperidone 應謹慎使用於：與其他可能造成QT interval 延長的藥品併用時、本來具有心臟傳導間隔問題的病人如QTc、顯著電解質失衡的病人、及有心臟疾病的病人（例如充血性心臟衰竭患者）。

#### ◎ 醫療人員應注意事項：

1. 為病人處方含 domperidone 成分藥品時，宜從最低有效治療建議劑量開始。
2. Domperidone 不應與ketoconazole 併用，若與其他CYP3A4 抑制劑藥品併用時因有可能增加domperidone 血中濃度，也應小心處方。
3. 提醒正服用 domperidone 的病人，如果出現心律異常的徵兆或症狀包括：頭暈，心悸，暈厥或癲癇發作等，應停止服用並即刻回診就醫