

# 藥 品 通 知

藥科字第 10104-001 號

## 一、 重要訊息通知：

1. 全國藥物不良反應通報中心依加拿大( Health Canada )政府評估一項於荷蘭進行的研究報告，於3月2日發布含domperidone 成分藥品之安全資訊，提醒該成分藥品與心室心律不整及突發性心因性死亡之關連性。因此提出以下建議：
  - (1) Domperidone 應以最小有效劑量為起始治療劑量，包括使用於帕金森氏症病人。
  - (2) 較高的心室心律不整及突發性心因性死亡風險，可能出現於每天服用 domperidone 劑量超過30mg 的病人，及年齡大於60歲以上的病人。
  - (3) Domperidone 應謹慎使用於：與其他可能造成QT interval 延長的藥品併用時、本來具有心臟傳導間隔問題的病人如QTc、顯著電解質失衡的病人、及有心臟疾病的病人（例如充血性心臟衰竭患者）。
2. 全國藥物不良反應通報中心依美國FDA101年2月28日及3月1日發布降膽固醇statin類藥品之重要用藥安全資訊仿單更新訊息◎ 建議醫療人員應注意事項：
  - (1) 處方含statin類藥品前，宜醫師謹慎評估其臨床效益及風險，尤其是併用藥品為病人治療時，注意監測病人服藥後之不良反應發生情形。
  - (2) 病人如果出現疑似肝功能異常相關臨床表徵時，宜考慮中斷statin類藥品之治療。
  - (3) 儘量避免將HIV或HCV protease inhibitors 與lovastatin及simvastatin併用。如為病人診治時，有需要同時處方HIV or HCV protease inhibitors 與statin類藥品時，應遵循各藥品仿單標示之配伍禁忌及建議劑量之限量。

## 二、 藥品變更：

舊品	新品	換藥原因
SPAGASGEL TAB. 院內碼【SECT】	COLIOPAN TAB. 院內碼【CLPT】	原廠停產
STROCAINE (STAWEI) TABLET 院內碼【STCNT】	STROCAINE TABLET 院內碼【STRCT】	改用原廠。