

# 藥 品 通 知

藥科字第 9703-001 號

## 一、 重要訊息通知：

- 1、依據衛生署「衛署藥字第 0970303859 號」來函，KETO(Ketorolac) amp. 於全國藥物不良反應通報系統中發現數件通報案例，衛生署於 97 年 1 月 17 日起公告「(1) Ketorolac 不可用於退燒。(2) 台灣曾有病患使用 Ketorolac 導致過敏性休克，甚至死亡之案例發生，應小心使用本藥品。(3) 使用注射劑型之 Ketorolac 成分藥品時，需有急救設備備用，注射後半小時內應有人監控病患之安全性。」
- 2、依據衛生署「衛署藥字第 0970303861 號」來函，有關含 atorvastatin (Lipitor) 成分藥品，對於近期曾發生中風 (haemorrhagic stroke 或 lacunar stroke without coronary heart disease) 之病患每天服用 80mg atorvastatin 有可能增加出血性中風之危險；若併服抑制代謝酵素 cytochrome P450 3A4 作用之藥物，也會增加出血性中風之風險。請醫師為病患處方 Lipitor 80mg/day 時，宜審慎評估用藥之風險與效益。
- 3、依據衛生署「衛署藥字第 0970300754 號」來函，美國 FDA 最近評估 11 種癲癇藥品 (本院有 Tegretol、、、、)，發現服用病患有增加其自殺意念或行為之風險，醫師為病患處方該些藥品時應告知病患或家屬，服藥後可能出現自殺意念或行為之不良反應，健康照護者應嚴密監控患者用藥後之安全，尤其是在開始服藥的第 1 週並持續至少 24 週。
- 4、依據健保局「健保北審字第 0970027773 號」來函，Levofloxacin(Cravit) 口服劑型核准適應症：有感受性細菌引起之呼吸道感染症、耳鼻喉科感染症、泌尿道感染症、子宮內感染、子宮頸管炎、子宮附屬器炎、細菌性赤痢、腸炎、巴多林氏腺炎、輕度及中度皮膚軟組織淺表性感染；注射劑核准適應症：治療因對 Levofloxacin 有感受性的致病菌所引起之下列感染社區性肺炎、複雜性尿道感染 (包括：腎盂腎炎)，皮膚及軟組織感染。請勿用於院內型肺炎等非衛生署核准適應症之使用。

## 二、 藥品變更：

院內碼	舊品	新品	換藥原因
SECT	SECTRAL <sup>®</sup> (ACEBUTOLOL)400MG TAB. (安萬特)	ABUTOL <sup>®</sup> (ACEBUTOLOL)400MG TAB. (生達化學)	原廠停產
GSCT	KASCOAL <sup>®</sup> (GASCON) TABLETS 散裝藥錠 (永信藥品)	KASCOAL <sup>®</sup> (GASCON) TABLETS 排裝 (永信藥品)	廠牌不變。改為排裝增加藥品安定性及方便保存。
CODI	CO-DIOVAN 80MG TAB. 排背原為黑色字體印刷	CO-DIOVAN 80MG TAB. 排背改為紅色字體印刷	變更排背印刷顏色，以利識別。

